


10 вопросов детскому



фтизиатру

*На Ваши вопросы отвечает
главный внештатный детский фтизиатр Пензенской
области, заведующий детским
отделением поликлиники,
врач-фтизиатр высшей категории*

Стасько Елена Юрьевна,

Вопрос №1

Добрый день! Ребенку 11 лет, полгода назад сделали диаскинтест, он оказался положительным. Мы сделали КТ, сдали анализы, все хорошо. Сейчас в школе опять должны делать Манту. Мне давать согласие или нет?

Здравствуйте! В возрасте 11 лет проводится проба диаскинтест, повторное проведение может быть рекомендовано через 3-6 месяцев.

Вопрос № 2

Добрый день. Какое исследование лучше выбрать квантифероновый тест или t-spot?

Здравствуйте! Если нет сопутствующих заболеваний, то оба теста равноценны

Вопрос № 3

Доброе утро. У ребенка до 6 месяцев был мед отвод от прививок, сейчас сыну 9 месяцев, педиатр требует реакцию Манту, можно ли вместо этого сделать Т- спот?

Здравствуйте! Диагностический тест Т-СПОТ не является скрининговым для отбора детей на вакцинацию БЦЖ (исходя из Вашего вопроса, ребенок при рождении не был вакцинирован БЦЖ). Для этой цели используется реакция Манту.

Вопрос № 4

Добрый день! Можно ли делать Квантифероновый тест через неделю после диаскинтеста и через две

недели после Манту? Как это повлияет на результат? Спасибо.

Здравствуйте! Абсолютных противопоказаний нет, но желательно выдержать интервал 2 месяца во избежание ложноположительного результата.

Вопрос № 5

Здравствуйте! Обязательно ли маме ребенка, которому сделали Т-спот и он отрицательный, делать флюорографию, чтоб ребенку выдали справку от фтизиатра, что ребенок здоров?

Здравствуйте! Да, обязательно, так как в необходимый диагностический минимум обследования ребенка у врача-фтизиатра входит флюорографическое обследование родителей.



Вопрос № 6

Добрый день! Можно ли отказаться от Диаскинтеста в школе и поставить Манту?

Здравствуйте! Да, можно. Необходимо оформить письменный отказ от постановки диаскинтеста, и обратиться к участковому врачу-педиатру либо детскому фтизиатру для направления на постановку реакции Манту.

Вопрос № 7

Добрый день.Нужно пройти ежегодную диспансеризацию, в списке есть флюорография.Можно ли сделать T SPOT самостоятельно (без записи к фтизиатру и без направления от него) и с результатом идти к терапевту? Благодарю за ответ.

Здравствуйте! Для прохождения диспансеризации необходима флюорография органов грудной клетки, так как при ней можно заподозрить не только туберкулез, но и другие заболевания легких. T SPOT можно сделать самостоятельно, без направления, но заменой ФГО в данном случае он не является.

Вопрос № 8

Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, делают ли в государственных поликлиниках T-Spot тест?

Здравствуйте! T-spot - коммерческий метод исследования, не включен в Программу ОМС и выполняется платно.



Вопрос № 9

Здравствуйте!Какой инкубационный период туберкулеза у детей??

Добрый день! Инкубационный период первичного туберкулеза, который, как правило, встречается у детей, длится от 3 месяцев до года.

Исходом может быть:

- полная элиминация (выведение) возбудителя из организма;
- инфицирование, когда МБТ присутствуют в организме, но заболевание еще не развилось и может никогда не развиться;
- заболевание туберкулезом.

Вопрос № 10

Добрый день! Подскажите, хотим сделать ребёнку т-спот вместо Манту для детского сада. Достаточно будет для фтизиатра этого теста, анализа крови и мочи, и флюорографии папы? Я кормящая мама и не могу сделать флюорографию, последний раз делала ее 2,5 года назад.

Добрый день! Если Вы планируете вместо иммунологических проб (Манту, диаскинтест) выполнить T-Spot, то для получения справки у фтизиатра необходимо предоставить так же результаты исследования крови, мочи, флюорографии всех взрослых, проживающих с ребенком. Кормление грудью не является противопоказанием для прохождения флюорографии, а наоборот, это прямое показание для её проведения (в соответствии с приказом Минздрава от 21.03.2017 № 124н " Об утверждении порядка и сроков проведения профилактических медицинских осмотров граждан в целях выявления туберкулеза"), как ближайшее окружение новорожденного.

